


Identification

Wat	Inoculum d'endomycorhizes
Composition	Mycorhize du genre <i>Rhizophagus spp.</i> et <i>Funneliformis spp.</i> (e.a. <i>Rhizophagus irregularis</i> et <i>Funneliformis mosseae</i>)
Concentration	50 spores par gram
Forme	Granulés (1 - 2 mm)
Nr. d'agr	EM006.D



Caractéristiques

- Préparation naturelle à base de *Rhizophagus spp.* et *Funneliformis spp.* (e.a. *Rhizophagus irregularis* et *Funneliformis mosseae*).
- Le mycorhize est un champignon du sol qui vit en symbiose avec les racines des plantes. Le champignon profite des hydrates de carbone (sucres) fournis par la plante et les plantes sont en contrepartie mieux approvisionnées en éléments nutritifs et en eau par leur présence.
- Grâce aux nombreuses ramifications des filaments mycéliens des mycorhizes, les racines sont, en quelque sorte, prolongées sans demander de l'énergie supplémentaire à la plante. Ainsi, l'eau et les éléments nutritifs qui se trouvent à l'extérieur de la zone racinaire peuvent également être assimilés.
- **Action:**



- Pour un enracinement plus rapide et plus profond après le semis, la plantation ou le rempotage. Il en résulte une meilleure croissance et moins de plantes mortes.
- Une meilleure assimilation des éléments nutritifs permet une production plus élevée et diminue le risque de maladies de carence
- Pour des plantes plus résistantes aux facteurs de stress externes (climat...)
- Indispensable pour les plantes aux racines sensibles, pour les plantes qui s'enracinent difficilement et pour les plantes très précieuses
- Utilisable en agriculture et horticulture biologiques conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et de ses modifications.

Emballage

Sachet de 3 kg – 4 sachets/EB (= 12 kg)



DCM MYCORRHIZAE

Préparation naturelle

Application

Incorporer DCM MYCORRHIZAE dans le sol et répartir le produit de manière homogène, le plus près possible de la zone racinaire, à proximité des jeunes racines. Demandez nos conseils spécifiques, adaptés à vos plantes et votre système de culture.

Mesurette = 2 grammes

GAZONS & TERRAINS DE SPORT ENGAZONNES

- Aménagement.....100 - 200 g/100 m², à incorporer par ratissage dans la couche supérieure, en même temps que les semences de gazon
- entretien100 - 200 g/100 m², à incorporer dans la couche supérieure lors d'une aération mécanique (p. ex. carottage)

ARBRES (FRUITIERS) ET ARBUSTES D'ORNEMENT 0,5,- 2 g/L trou de plantation
à incorporer dans le trou de plantation

RAISINS8 – 12 g/plante

LEGUMES & HERBES AROMATIQUES100 - 150 g/100 m² à mélanger dans la zone racinaire

LEGUMES & FRUITS SOUS SERRE.....2 – 5 g/plante

TERREAU0,5,- 2 g/L trou de plantation
à mélanger dans le terreau avant plantation ou avant rempotage

Stockage

Bien fermer l'emballage après utilisation. Après ouverture, le produit se conserve pendant 6 mois.

Protéger du soleil. Conserver à une température entre 5 °C et 20 °C.

Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Conserver au sec et à l'abri du gel.

Ne pas stocker près de pesticides.

Compatibilité

Eviter d'utiliser le produit en combinaison avec ou après l'application de certains traitements fongicides : nous consulter pour plus d'informations.

Eviter d'utiliser le produit en combinaison avec une fertilisation chimique riche en azote ou en phosphore.

Préférer la gamme d'Engrais Organiques DCM. Grâce à leur action douce et longue, ils sont spécialement adaptés pour le DCM MYCORRHIZAE.

Veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations sur la compatibilité du produit et période d'attente.

Domaines d'application

LEGUMES & HERBES

La plupart des variétés e.a.

<i>Allium ascalonicum</i>	Echalote
<i>Allium cepa</i>	Oignon
<i>Allium porrum</i>	Poireau
<i>Allium sativum</i>	Ail
<i>Capsicum annuum</i>	Poivron
<i>Laurus schoenoprasum</i>	Ciboulette
<i>Laurus nobilis</i>	Laurier sauce
<i>Lavendula</i>	Lavande
<i>Ocimum</i>	Basilic
<i>Rosmarinus</i>	Romarin
<i>Solanum melongena</i>	Aubergine

FRUITS, PETITS FRUITS, BAIES & NOIX

La plupart des variétés e.a.

<i>Aesculus</i>	Marronnier
<i>Cucumis melo</i>	Melon
<i>Fragaria</i>	Fraisier
<i>Juglans</i>	Noyer
<i>Juniperus</i>	Genévrier
<i>Malus</i>	Pommier d'ornement
<i>Prunus avium</i>	Merisier
<i>Pyrus</i>	Poirier
<i>Ribes</i>	Grosseillier à fleurs
<i>Sambucus</i>	Sureau
<i>Vitis vinifera</i>	Vigne

ARBRES

La plupart des variétés e.a.

<i>Acacia</i>	Mimosa
<i>Acer</i>	Erable
<i>Ailanthus</i>	Ailante
<i>Alnus</i>	Aulne
<i>Catalpa</i>	Catalpa
<i>Eucalyptus</i>	Eucalyptus
<i>Fraxinus</i>	Frêne
<i>Gleditsia</i>	Février
<i>Liquidambar</i>	Copalme
<i>Liquidambar styraciflua</i>	
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipier de Virginie
<i>Magnolia</i>	Magnolia
<i>Morus</i>	Mûrier
<i>Pauwlonia</i>	
<i>Phoenix canariensis</i>	Dattiers des Canaries
<i>Platanus</i>	Platane
<i>Quercus</i>	Chêne
<i>Salix</i>	Saule
<i>Sophora</i>	

BULBES

<i>Dahlia</i>	
<i>Tulipa</i>	Tulipe

ARBUSTES ORNEMENTAUX

<i>Berberis</i>	
<i>Buddleia</i>	
<i>Buddleia davidii</i>	Arbre à papillon
<i>Buxus</i>	Buis
<i>Calistemon</i>	Fleur-goupillon
<i>Callicarpa</i>	
<i>Caryopteris</i>	
<i>Ceanothus</i>	Barbe bleue
<i>Cercis</i>	Céanothe
<i>Chaenomeles japonica</i>	Arbre de Judée
<i>Choisya</i>	Cognassier du Japon
<i>Cornus</i>	Oranger du Mexique
<i>Cortaderia (syn. Gyneryum)</i>	Cornouiller
<i>Cotinus</i>	Herbe des pampas
<i>Cotoneaster</i>	Fustet, Arbre à perruques
<i>Cytisus</i>	Cotonéaster
<i>Deutzia</i>	Genêt
<i>Eleagnus</i>	
<i>Escallonia</i>	Chalef
<i>Euonymus</i>	Fusain
<i>Forsythia</i>	
<i>Genista</i>	
<i>Hamamelis</i>	
<i>Hebe</i>	Véronique
<i>Hibiscus syriacus</i>	Althea
<i>Hypericum</i>	Millepertuis
<i>Ilex</i>	Houx
<i>Kerria japonica</i>	Corète du Japon
<i>Kolkwitzia</i>	
<i>Laburnum</i>	Cytisse à grappes
<i>Lagerstroemia</i>	
<i>Ligustrum</i>	Troène
<i>Lonicera nitida</i>	
<i>Mahonia</i>	
<i>Nandina</i>	
<i>Nerium oleander</i>	Laurier rose
<i>Philadelphus</i>	Seringat
<i>Pittosporum</i>	
<i>Potentilla</i>	Pottentille
<i>Prunus</i>	
<i>Prunus lauracerasus</i>	
<i>Prunus lusitanica</i>	
<i>Prunus serrulata</i>	
<i>Prunus triloba</i>	
<i>Pyracantha</i>	Buisson ardent
<i>Rhus typhina</i>	Suma de Virginie
(syn. <i>Rhus hirta</i>)	
<i>Rosa</i>	Roses (tous types)
<i>Santolina</i>	Santoline
<i>Spiraea</i>	Spirée
<i>Symphoricarpos</i>	Symphorine
<i>Syringa</i>	Lilas
<i>Tamarix</i>	Tamaris
<i>Viburnum</i>	Viorne
<i>Viburnum tinus</i>	
<i>Viburnum opulus</i>	
<i>Weigela</i>	
<i>Yucca</i>	

Domaines d'application

CONIFERES

Araucaria
Chamaecyparis
Cryptomeria
Cupressocyparis leylandii
Cupressus
Ginkgo
Juniperus
Larix
Metasequoia
Podocarpus
Sequoia
Sequoiadendron
 (syn. *Wellingtonia*)
Taxus
Thuja
Tsuga

Cyprès de Leyland
 Cipres
 Arbre de quarante écus
 Genévrier
 Mélèze
 If
 Thuya

TERREAU

La plupart des annuelles, bisannuelles et vivaces, e.a.

Cyclamen
Pelargonium | Géranium

GAZON

Gazons d'ornement et de jeu, terrains de sport engazonnés (pour football, rugby, polo...), parcours de golf...

Les produits DCM sont conformes aux données indiquées sur leur emballage et/ou la fiche technique et sont entièrement traçables. Les conseils sur les produits sont fournis à titre indicatif uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Le mode d'emploi est basé sur plusieurs années d'expérience pratique et de recherche. Chaque plante et chaque système de culture a ses propres besoins. Le moment de l'application, le type de sol/substrat et les normes réglementaires sont également importants pour déterminer la dose nécessaire. Il est conseillé (bonne pratique) de tester préalablement toute nouvelle application de produit à petite échelle. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits.

FICHE TECHNIQUE POUR LA BELGIQUE – BEFR – DBOE - 230626