



La mouche de la cerise PHÉROMONE/SUBSTANCE ATTRACTIVE RHAGO-PHEROMONE®



Toute une série d'insecticides traditionnels n'étant plus disponibles, la mouche de la cerise a pu se répandre largement ces dernières années, au grand malheur des passionnés de cerises. Certaines variétés de cerisiers sont plus sensibles à la mouche de la cerise que d'autres et le degré d'infestation peut fortement varier d'une région à l'autre. Le piège englué jaune **DCM Yellow-Trap**, en combinaison avec **DCM Rhago-Pheromone®**, permet de surveiller efficacement une infestation débutante. Sachez toutefois, que d'autres insectes, tels que les pucerons, sont également attirés par la couleur jaune de la plaque engluée.

La mouche de la cerise pond ses œufs sur les jeunes fruits lorsque ceux-ci commencent à changer de couleur. Les petits asticots qui sortent des œufs se développent dans les fruits en se nourrissant de la chair. A la fin de sa croissance, la larve quitte le fruit et se laisse tomber à terre pour se nymphoser.

dans le sol, sous forme de pupes! Garder des poules sous vos cerisiers peut contribuer à éliminer les larves et les pupes qui ont passé l'hiver. Si vous ne réagissez pas, la population de cette mouche dévastatrice s'accroîtra annuellement et vous risquerez de n'avoir plus aucune cerise comestible dans vos arbres après quelques années. La **DCM Rhago-Pheromone®** et la couleur du piège englué **DCM Yellow-Trap** contribuent toutes deux à attirer les mouches adultes.

Infestation: Mouche de la cerise (*Rhagoletis cerasi*)

Surveillance: mouche adulte



- mouche: max. 0,5 cm de long, se trouve aussi bien sur le cerisier acide que sur le cerisier doux
- dessin noir très particulier, avec une tache jaune caractéristique sur le dos au niveau du thorax et trois bandes transversales dont la dernière se prolonge sur le bord des ailes

Dégâts: larves/asticots

- asticot typique, de couleur blanche, dont la tête et la queue sont difficiles à différencier
- les fruits atteints présentent un trou de forage et des dommages autour du noyau.
- en cas de forte infestation, presque toutes les cerises seront atteintes!

Cycle de vie

La mouche de la cerise ne développe qu'une seule génération par an. Exceptionnellement, les larves qui se laissent tomber à terre pour se nymphoser peuvent survivre pendant trois ans



Merci d'avoir acheté un produit Naturapy®, une gamme de produits de la nature pour la nature !



Application

- Début mai, installez un piège **DCM Yellow-Trap** muni d'une capsule (plaquette de couleur blanche) de **DCM Rhago-Pheromone®** en bas de la couronne de votre cerisier ou guignier. Placez-le à un endroit qui vous permet de le contrôler et de remplacer la capsule ou la plaque engluée sans difficulté.
- La capsule de phéromone est dotée d'un évidement qui permet de la fixer sur le piège englué jaune. Veillez à ne pas toucher la capsule avec les doigts. Le moindre contact suffit en effet pour que la phéromone se retrouve sur vos mains ou sur vos doigts. Sans vous en rendre compte, vous laissez ainsi une trace olfactive sur tous les objets touchés plus tard. Refermez l'emballage et conservez la deuxième capsule pour plus tard dans la saison ou l'année suivante.
- La phéromone reste active pendant 6 à 8 semaines, remplacez-la donc en temps opportun.

- La mouche de la cerise étant également attirée par la couleur, il peut être utile d'installer plusieurs pièges englués, sans phéromone, en bas de la couronne pour capturer plus d'insectes et pour donc assurer une meilleure maîtrise de l'infestation.

Conservation

- La capsule de phéromone restante peut être conservée au congélateur ou au réfrigérateur. Les phéromones se conservent jusqu'à 2 ans au congélateur et pendant un an au réfrigérateur. Veillez à bien refermer le sachet pour éviter que la phéromone ne s'évapore !

Effet visible

Contrôlez le piège tous les 2 jours et remplacez la plaque engluée dès qu'elle est saturée de mouches de la cerise et/ou d'autres insectes.

Remarques importantes

- Après réception de votre commande, veillez à appliquer la phéromone au plus vite ou à la conserver de manière adéquate. Il s'agit en effet de phéromones qui n'ont qu'une durée de conservation limitée à température ambiante.
- Après réception de la confirmation de livraison, vous êtes tenu d'enlever ou réceptionner votre commande. Si la commande n'est pas retirée dans le délai prévu, le centre de jardinage ne peut être tenu responsable d'une éventuelle dégradation du produit. En tant qu'acheteur, vous êtes responsable dès la réception de votre commande à domicile ou au centre de jardinage.
- Veillez à bien suivre les instructions d'utilisation et de conservation du produit figurant sur la notice explicative.

*Nous vous souhaitons beaucoup de **succès**!
Il suffit maintenant de laisser mère nature faire son travail!*

